

* 感染症登園のめやす

◆ 医師の診断後、登園前に医師の許可書が必要な疾患

疾患名	潜伏期間	感染経路	症状	感染期間	登園のめやす
麻疹 (はしか)	8日～12日 (7～18日)	空気感染 飛沫感染 接触感染	① カタル期：38℃以上の発熱、咳、鼻汁、結膜充血目やにが見られる。熱が一時下がる頃コプリック班と呼ばれる小斑点が頬粘膜に出現する (感染力はこの時期に最も強い) ② 発疹期：一次下降した熱が再び高くなり、耳後部から発疹が現れて下方に広がる。発疹は赤みが強く、少し盛り上がっている。融合傾向があるが健康皮膚面を残す。 ③ 回復期：解熱し、発疹は出現した順に色素沈着を残して消退する。	発熱1～2日前から 発心出現後の4日間	解熱をした後、2日間を経過するまで症状により、感染力が強いと認められた時は長期に及ぶこともある
風疹 (3日はしか)	16～18日 通常 14～23日	飛沫感染 接触感染	発熱・発疹・リンパ節腫脹：発熱の程度は一般に軽い。発疹は淡紅色の班状丘疹で、顔面から始まり頭部、体幹、四肢へと拡がり、約3日で消えるリンパ節腫脹は有痛性で頸部、耳交介後部、後頭部に出現する。	発疹出現7日前から 発疹出現後7日間まで	発疹が消えるまで
水痘 (水ぼうそう)	14日～16日 (10日～21日)	空気感染 飛沫感染 接触感染	発疹は体幹から全身に、頭髪部や口腔内にも出現する。紅斑から丘疹、水疱、痂皮の順に変化する。種々の段階の発疹が同時に混在する。発疹はかゆみが強い	発疹が出現する1～2日前から、すべての発疹が痂皮化する	すべての発疹が痂皮化する *水痘の感染力は極めて強く集団感染を起こす(接触後72時間以内にワクチンを接種することで、症状の軽減が期待できる)

疾患名	潜伏期間	感染経路	症 状	感染期間	登園のめやす
インフルエンザ	1日～4日 平均2日	飛沫感染 接触感染	突然の高熱が出現し、3～4日続く。全身症状（全身倦怠感、関節痛、筋肉痛、頭痛）を伴う。 呼吸器症状（咽頭痛、鼻汁、咳） 約1週間で軽快する。 （合併症）肺炎、中耳炎、熱性けいれん、脳症	症状がある期間発症前24時間～発症後3日程度までが最も感染力が強い	発病した後5日を経過し、活解熱した後3日を経過するまで発病 5日 発病後 3日目に解熱 3日経過してから 当日は0と数えます
咽頭結膜熱 （プール病） アデノウイルス感染	2～14日	飛沫感染 接触感染 プールで目の結膜からの感染もある	39℃前後の発熱、咽頭炎（咽頭発赤・咽頭痛）頭痛 食用不振が3～7日続く。 目の症状として結膜炎（結膜充血）涙が多くなる まぶしがる、眼脂肪	咽頭から2週間 糞便から数週間 排泄される 九世紀の最初の数日が最も感染あり	主な症状（発熱、咽頭発赤、目の充血）が消失してから2日を経過するまで
	7～10日 （5～12日）	鼻咽頭や気道からの分泌による 飛沫感染 接触感染0			